



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΩΚΤΟΥ & ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Ε.Π.Ε.

Δρ. Α. Σταματιάδης

Παπαδιαμαντοπούλου 24β, 115 28 Αθήνα. Τηλ.: 210 7470555, fax: 210 7474685

www.proktos.gr, e-mail: cololab@colorectal.gr

ATHENS COLORECTAL LABORATORY LTD.

A. Stamatiadis M.D.

24b, Papadiamantopoulou 115 28 Athens, Greece. Tel.: +30 210 7470555, fax: +30 210 7474685

www.proktos.gr, e-mail: cololab@colorectal.gr

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΚΤΟΥ

Η καλύτερη μέθοδος θεραπείας των κονδυλωμάτων του πρωκτού είναι η αφαίρεση και ο καυτηριασμός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ενδοπρωκτικά κονδυλώματα. Καλό είναι να γίνει έλεγχος και για άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα όπως AIDS, ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη.

Κατά την εξέταση από τον χειρουργό-πρωκτολόγο πραγματοποιούνται συνήθως οι ακόλουθες εξετάσεις

- Κυτταρολογική εξέταση για διάγνωση δυσπλαστικών-(προκαρκινωματωδών) αλλοιώσεων στο εσωτερικό του πρωκτού.
- Πρωκτοσκόπηση με την τεχνική acetowhitening για διάγνωση ενδοπρωκτικών κονδυλωμάτων.
- Σε περίπτωση δυσπλασίας πρέπει να γίνει πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας (high resolution anoscopy).
- Αποστολή των αφαιρεθέντων τεμαχιδίων ιστών για παθολογοανατομική-μικροσκοπική εξέταση.
- Εξέταση PCR για ανεύρεση του υπότυπου του ιού HPV. Οι συνήθεις επικίνδυνοι υπότυποι είναι οι 16,18,33,35,58)

Μετά την αφαίρεση των κονδυλωμάτων παραμένει ένα τραύμα στην περιοχή του πρωκτού. Το τραύμα αυτό προκαλεί εκροή οροαιματηρού υγρού για περίπου 10 μέρες. Εάν υπήρχε επέκταση των κονδυλωμάτων μέσα στον αυλό του πρωκτού, το τραύμα επεκτείνεται και μέσα στο εσωτερικό του πρωκτού. Για την καλή επούλωση του τραύματος που θα γίνει μέσα σε 5-10 μέρες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

- Αλλαγή της γάζας όταν αυτή λερώνεται (2-3 φορές την ημέρα).
- Καλό πλύσιμο με χλιαρό προς ζεστό νερό χωρίς χαρτί.
- Δεν χρειάζεται χρήση αντισηπτικού.
- Πολλά λαχανικά, φρούτα και υγρά για να είναι μαλακά τα κόπρανα.
- Παραμονή στην τουαλέτα μόνον 5 λεπτά.
- Σε περίπτωση έντονης αιμορραγίας ή πυρετού επικοινωνία με τον ιατρό.
- Αποφυγή χρήσης μηχανής σαν μεταφορικό μέσο.
- Αποφυγή γυμναστηρίου για μία εβδομάδα.
- Απαραίτητα πρέπει να αποφεύγονται για πάντοτε οι κρέμες κορτιζόνης.

Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό μετά μία εβδομάδα απογευματινές ώρες, για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σε επείγουσα περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό στο τηλέφωνο.

Επανεξέταση μετά από διάστημα 4-6 εβδομάδων γιατί τα κονδυλώματα μπορεί να επανεμφανισθούν, συνήθως σε μικρότερη έκταση.